

Mezoterapi İğnesi

1. Mezoterapi uygulamaya uyumlu olmalıdır.
2. Bir kutu içinde 100 adet şeklinde olmalıdır.
3. Steril paket içinde olmalıdır.
4. İğne formu 32G x 6mm şeklinde olmalıdır.
5. İğne non-pyrogenic olmalıdır.
6. İğne tek kullanımlık olmalıdır.
7. İğne intradermal uygulamalarda kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
8. İğne paketi üzerinde LOT, REF ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9. CE sertifikasına sahip olmalıdır.

gnt

Mezoterapi Serumları Teknik Şartname

1. Flakonlar steril olmalıdır.
2. Intradermal uygulamaya uygun olmalıdır.
3. PH ve fizyolojik açıdan dengelenmiş olmalıdır.
4. Büyüme faktörü içermelidir.

Dr. Cemal GILAC
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 157705
Uz. B. Tıp. No: 03024

%20 GLİKOLİK ASİT KİMYASAL PEELİNG SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

1. %20 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 1.evresinde, ton dengesizliği, ifade çizgileri ve yüzeysel kırışıklıkların açılmasında etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %20 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %20 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %20 glikolik asit içeriğinde: aqua, glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylsotiazolinone-methylchloroisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Doc. Dr. Cemal BİLAC
Celal Bayar Üni. Dermatoloji AD
0312 251 10 00 5
L. 1. T. 5. No: 6-5

%50 GLİKOLİK ASİT KİMYASAL PEELİNG SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

1. %50 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 3.evresinde, orta derece foto yaşlanma, cilt gevşekliliği, açık gözenekler, orta derece diskromi, yüzeysel akneler ve orta derece çizgilerin giderilmesinde etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %50 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %50 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %50 glikolik asit içeriğinde: glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylsotiazolinone-methylchloroisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Dr. Feriye HİDAE
T.C. Sağlık Bakanlığı
Maden İhtisatçıları ve
Maden İşçileri Sendikası
Maden İşçileri Sendikası
Maden İşçileri Sendikası

%35 GLİKOLİK ASİT KİMYASAL PEELİNG SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

1. %35 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 2.evresinde, ton dengesizliği, ifade çizgileri ve yüzeysel kırışıklıkların açılmasında etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %35 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %35 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %35 glikolik asit içeriğinde: glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylthiazolinone-methylchloroisoethiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır

Doç. Dr. Cemil ELİAÇ
Cemil Eliaç Kimya Sanayi A.Ş.
No. 101. No: 10000000000000000000
SİİTİ, T.C. No: 6.555

%70 GLİKOLİK ASİT KİMYASAL PEELİNG SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

1. %70 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 3. – 4. evrelerinde, ilerlemiş foto yaşlanma, orta-derin çizgiler, yoğun ton dengesizliği, cilt gevşekliği, pigment lezyonları, senilis-güneş lentigo ve orta derece akne skarlarının giderilmesinde etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %70 glikolik asit pH derecesi 1'den küçük olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %70 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %70 glikolik asit içeriğinde: aqua, glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylsotiazolinone-methylchlorisotiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Dr. Cemal PİLAC
Cell. 0532 300 00 00
E-mail: cemal.pilac@ttn.com.tr